

Mundgesundheit von Anfang an

20.11.24

Online

Handout kommt!



Dr. Tobias Tetzlaff

Tätig in der Kinderzahnheilkunde seit
2011, eigene Praxis mit 50
Teammitgliedern seit 2014

Vorstand der DAJ seit 2024
Vorsitzender des Jugendzahnpflegeausschusses
der Zahnärztekammer Niedersachsen

Zertifizierter Kinderzahnarzt durch APW
Z-Curriculum der DGZH 2013
Curriculum Lachgas- und orale Sedierung
2012

Referententätigkeit für den MDK, FINZZ,
Ärztekammer, Zahnärztekammer, MHH
Elternschule
Kindergärten, Hebammenschule



Doc Tetzlaff








Löwenzahnarzt
Mein Kinderzahnarzt in Hannover

 Karies ist eine „erworbene Infektionskrankheit“

Zucker-zu-Zahnkaries






— pH-Wert im Mund

— Kritischer pH-Wert, bei dem der Zahn-Auflösevorgang beginnt

In der Nacht kaum Speichel



Der Biorhythmus der Fließrate des unstimulierten Gesamtspeichels.
(nach Dawes C et al. Arch Oral Biol 49, 2004)

 Stillen oder Milchflasche bestenfalls VOR dem Putzen

- **Kariesbakterien kommen von anderen Menschen**
(meist Mutter, aber auch Vater, Geschwister,
andere Kinder)



Zahnärztliches Kinderuntersuchungsheft

Name des Kindes


Geburtsdatum

		Untersuchung	Termin
U5	UZ 1	ab 1. Zahndurchbruch 6. - 9. Lebensmonat	
U6	UZ 2	ab 10. Lebensmonat	
U7	UZ 3	ab 21. Lebensmonat	
U7a	UZ 4	ab 34. Lebensmonat	
U8	UZ 5	ab 46. Lebensmonat	
U9	UZ 6	ab 60. Lebensmonat	

- Beim ersten Kind mit dem ersten Zahn zum Zahnarzt (Aufklärung)
- Bei dem zweiten, dritten,... Kind mit dem Eckzahn zum Zahnarzt



- 🦷 Flächige Kontakte der Milchmolaren
- 🦷 Schmelz dünner und weniger mineralisiert



„Interessante“ Zeitpunkte **x**



1) Nach Durchbruch der
Oberkieferschneidezähne
(Beratung Stillen, Flasche,
Schmelzdefekte)
(6-12 LM)

2) Nach Durchbruch
Milcheckzähne (18-24LM)

3) Nach Durchbruch der hinteren
Milchbackenzähne(18-24LM)

Danach Kontrolle alle sechs Monate

👤 Stufe 1: Weiße Stellen



👤 Stufe 2: Gelbe/Braune Stellen



🦷 Stufe 3: Braune/gelbe tiefe Stellen



🦷 Stufe 4: Zerstörung der Zahnkrone



Immer Narkose?



**Zunehmende Erfahrung im Umgang
mit pädiatrischen Patienten senkt das
Risiko erheblich ***


(The Lancet Respiratory Medicine anhand von 31127 Narkosen)



Alternativen minimalinvasiv möglich – Beispiel SDF „Silber-Diamin-Fluorid“

In Australien und Südamerika seit den frühen 80er Jahren als Kariesarretierung in Benutzung

In PubMed derzeit ca. 546 Abstracts derzeit zu SDF







Folgen Sie mir und meinem Team